


# MILUMIL HA START PROSYNEO

Allergiaprevenció másként\*


## scGOS/lcFOS (9:1)

- ✓ Bizonyítottan csökkenti az allergia kialakulásának gyakoriságát <sup>1,2</sup>



## scGOS/lcFOS (9:1) és Bifidobacterium breve

- ✓ Csökkenti az atópiás dermatitisz kialakulását <sup>3</sup>



\* Hidrolizált tejfehérje scGOS/lcFOS és Bifidobacterium breve M-16V kiegészítéssel

1. Arslanoglu, S., et al., Early neutral prebiotic oligosaccharide supplementation reduces the incidence of some allergic manifestations in the first 5 years of life. J Biol Regul Homeost Agents, 2012. 26(3 Suppl): p. 49-59.

2. Osborn DA, Sinn JK. Prebiotics in infants for prevention of allergy. Cochrane Database Syst Rev. 2013;3:CD006474.

3. Chua MC, és mtsai. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2017.

# MILUMIL HA START PROSYNEO

## SZIMBIOTIKUS TÁPSZER



Hipoallergén, tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer, hidrolizált fehérjével

TB támogatással írható: **0-1 évig**  
Térítési díj: **1798 Ft**

- ✓ Módosítja a bélflóra összetételét<sup>3,4</sup>
- ✓ Császármetszéssel született csecsemőknél gyorsítja a Bifidobaktérium-kolonizációt<sup>3</sup>

