EGYEDI SZAKÉRTELEM

40 évnyi, **a csecsemőtáplálás területén végzett kutatómunka** eredményeként, a NUTRICIA 400 kutatóból és szakértőből álló csapata kifejlesztette a Milumil® tejalapú, anyatej-helyettesítő formulát, melynek összetétele úgy lett kialakítva, hogy hozzájáruljon kisbabád táplálkozási szükségleteinek biztosításához növekedésének minden szakaszában.

A **Milumil® HA1 optima** egyedülálló, tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer **Pronutra™** formulával, kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy csökkentse a tehéntejfehérje-allergia kialakulásának kockázatát.

40 — év — kutatás

a csecsemőtáplálásban

Válogatott összetevők egyedi keveréke

Szabadalmaztatott galakto- és frukto-oligo-szacharid keverék: scGOS/lcFOS (9:1)

Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsav

Részlegesen hidrolizált fehérjével

A kisgyermekkor szakaszai

Első nap

3 év

Kisgyermeked táplálását tovább folytathatod termékeinkkel:

- **Milumil® HA2 optima**, tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer, 6-12 hó
- **Milumil® HA Junior 1+** gyerekital, 1 éves kortól

Fordulj hozzánk bizalommal!

Ha kérdésed van kisgyermeked táplálásával, fejlődésével, vagy a Milumil® termékek használatával kapcsolatban, bátran hívd munkatársunkat!

06 80 33 12 33 — ingyenes zöldszám

milumil@milumil.hu — www.milumil.hu

Védőgázas csomagolásban.
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig
Tárolás: száraz, hűvős helyen (nem hűtőben, <25°C)
A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd!
A tápszer gyermekektől elzárva tartandó.

Származási hely: EU
Forgalmazó: Numil Kft., 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.

DANONE

TÁPANYAGTÁBLÁZAT

Átlagos értékek 100 ml tápszeroldatban (13,7 g tápszer)

Energia	**275 kJ**
	66 kcal
Zsírok	**3,4 g**
amelyből:	
telített zsírsav	**1,6 g**
egyszeresen telítetlen zsírsav	**1,2 g**
többszörösen telítetlen zsírsav	**0,5 g**
amelyből: hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP)	
- Linolsav (LA)	**421 mg**
- α-linolénsav (ALA)	**78 mg**
- Arachidonsav (AA)	**11 mg**
- Eikozapentaénsav (EPA)	**1,4 mg**
- Dokozahexaénsav (DHA)	**6,4 mg**
Szénhidrátok	**7,2 g**
ebből cukrok	**6,1 g**
- glükóz	**0,2 g**
- laktóz	**5,9 g**
poliszacharidok	**1 g**
- keményítő	**1 g**
Élelmi rost	**0,6 g**
Fehérje	**1,5 g**
amelyből:	
tejsavó fehérje	**1,5 g**
Só	**0,06 g**
Vitaminok	
A-vitamin	**50 µg-RE**
D_3-vitamin	**1,2 µg**
E-vitamin	**1 mg α-TE**
K_1-vitamin	**4,4 µg**
C-vitamin	**9,1 mg**
Tiamin (B_1)	**0,05 mg**
Riboflavin (B_2)	**0,1 mg**
Niacin (B_3)	**0,43 mg**
Pantoténsav (B_5)	**0,352 mg**
B_6-vitamin	**0,04 mg**
Folsav	**8,4 µg**
B_{12}-vitamin	**0,16 µg**
Biotin	**1,8 µg**
Ásványi anyagok	
Nátrium	**25 mg**
Kálium	**73 mg**
Klorid	**41 mg**
Kalcium	**46 mg**
Foszfor	**26 mg**
Magnézium	**5,1 mg**
Vas	**0,53 mg**
Cink	**0,5 mg**
Réz	**0,04 mg**
Mangán	**0,0075 mg**
Fluorid	**<5,5 µg**
Szelén	**1,5 µg**
Jód	**12 µg**
Nukleotidok	**3,2 mg**
Citidin-5'-monofoszfát	**1,1 mg**
Uridin-5'-monofoszfát	**0,77 mg**
Adenozin-5'-monofoszfát	**0,67 mg**
Guanozin-5'-monofoszfát	**0,23 mg**
Inozin-5'-monofoszfát	**0,45 mg**
Egyéb	
L-karnitin	**1 mg**
Kolin	**10 mg**
Inozitol	**4,1 mg**
Taurin	**5,3 mg**
GOS (Galakto-oligoszacharid)	**0,72 g**
FOS (Frukto-oligoszacharid)	**0,08 g**

Összetevők

Hidrolizált savófehérje koncentrátum (**tej**ből), laktóz (**tej**ből), növényi olajok (pálma-, repce-, kókusz-, napraforgó-, egysejtű olaj), galakto-oligoszacharid (**tej**ből), keményítő (burgonya, kukorica), emulgeálószer (mono- és diglicerideк citromsav észtere), frukto-oligoszacharid, kálium-dihidrogén-foszfát, kalcium-klorid, **hal**olaj, kolin-klorid, L-aszkorbinsav, **szója**lecitin, taurin, nátrium-L-aszkorbát, inozitol, vas-szulfát, cink-szulfát, uridin-5'-monofoszfát nátrium sója, citidin-5'-monofoszfát, DL-alfa-tokoferil-acetát, adenozin-5'-monofoszfát, inozin-5'-monofoszfát nátrium sója, L-karnitin, nikotinamid, guanozin-5'-monofoszfát nátrium sója, kalcium-D-pantotenát, D-biotin, rézszulfát, pteroilmonoglutaminsav, retinil-palmitát, DL-alfa-tokoferol, riboflavin, tiamin-hidroklorid, kolekalciferol, piridoxin-hidroklorid, mangán-szulfát, kálium-jodid, fitomenadion, nátrium-szelenit.

Allergének: összetevőlistában kiemelve.

10340205
633560
0123609-01-0004

▶ Először nyomd be, utána tépd fel!

600 g ℮

Milumil®

HIPOALLERGÉN, TEJALAPÚ, ANYATEJ-HELYETTESÍTŐ TÁPSZER
Újszülött kortól

1

NUTRICIA

Milumil®

HA OPTIMA

Csökkenti a tehéntejfehérje-allergia kialakulásának kockázatát

HIPOALLERGÉN, TEJALAPÚ, ANYATEJ-HELYETTESÍTŐ TÁPSZER

Újszülött kortól

1

600 g ℮

Minőségét megőrzi (nap, hónap, év):

PL 16616001 WE

5 997672 302202

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Milumil® HA1 optima

Standard hígítás: Mellékelt adagolókanál lesimítva = 4,56g Milumil® HA1 optima tápszerpor, 3 lesimított adagolókanál (13,7g) Milumil® HA1 optima tápszerpor + 90ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer.

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta	Ivóvíz (ml)	Adagoló-kanalak száma	Kész tápszer
1-2 hét	gyermekorvossal, védőnővel való megbeszélés alapján			
3-4 hét	6-7	90	3	100 ml
1-2 hónap	6	120	4	133 ml
3-4 hónap	5-6	150	5	167 ml
5-6 hónap	5-6	180	6	200 ml

Fontos figyelmeztetés!

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérdezd meg a gyermekorvost, védőnőt a tápszer használatáról!
- Ne térj el az orvos előírásától, illetve a használati utasítástól, mert ez zavart okozhat a kisbabád fejlődésében!

A tápszer elkészítése

1. Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit és mindig tiszta adagolókanalat használj.

2. Forrald fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe.

3. Mérd ki a cumisüvegbe a tápszerport (az adagolási táblázat szerint), zárd le, és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).

4. Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra.

5. Ellenőrizd a tápszeroldat megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

Gyermeked egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:

- A Milumil® HA1 optima tápszer 6 hónapos korig egyedüli táplálékforrásként, 6 hónapos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve alkalmazható.
- A tápszert minden étkezéshez frissen készítsd el és 2 órán belül használd fel, a maradékot pedig öntsd ki!
- Ne forrald fel a tápszeroldatot és ne használj mikrohullámú sütőt a tápszeroldat elkészítéséhez vagy melegítéshez a túlforrósodás veszélye miatt.
- Figyelj arra, hogy babád mindig felnőtt felügyelete mellett igyon, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogápolásról.
- A Milumil® HA1 optima tápszer nem alkalmazható: tejfehérje-allergia, laktóz-intolerancia, galaktozémia, glükóz-galaktóz malabszorpció, valamint hal- és szójaallergia esetén!
- A Milumil® HA1 optima tápszer a tehéntejfehérjét részben lebontott formában tartalmazza, ezért ize kismértékben eltérhet a szokásos tejalapú tápszerekétől.