

TÁPANYAGTÁBLÁZAT

NUTRICIA

Átlagos értékek 100 ml tápszeroldatban (14,82 g por)

Energia	285 kJ 68 kcal	C-vitamin	9,4 mg
Zsírok	3 g	Tiamin (B ₁)	0,05 mg
amelyből:		Riboflavin (B ₂)	0,12 mg
telített zsírsav	1,4 g	Niacin (B ₃)	0,45 mg
- LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak)		Pantoténsav (B ₅)	0,35 mg
-- Arachidonsav (AA)	5,7 mg	B ₆ -vitamin	0,04 mg
-- Dokozaheksaénsav (DHA)	5,7 mg	Folát	14 µg
-- Alfa-linolénsav (ALA)	71 mg	B ₁₂ -vitamin	0,09 µg
Szénhidrátok	8,4 g	Biotin	1,8 µg
amelyből:		Ásványi anyagok	
- cukrok	8,2 g	Nátrium	25,2 mg
-- amelyből laktóz	7,92 g	Kálium	78 mg
inozit	3,4 mg	Klorid	43 mg
Élelmi rost	0,6 g	Kalcium	62 mg
amelyből:		Foszfor	35 mg
- GOS (Galakto-oligoszacharid)	0,48 g	Magnézium	5,3 mg
- FOS (Frukto-oligoszacharid)	0,06 g	Vas	1,1 mg
Fehérje	1,60 g	Cink	0,54 mg
amelyből:		Réz	0,042 mg
- tejsavó fehérje	1,6 g	Mangán	0,008 mg
- kazein	0 g	Fluorid	≤ 6,1 µg
Vitaminok		Szelén	1,5 µg
A-vitamin	60 µg	Jód	13 µg
D ₃ -vitamin	1,4 µg	Egyéb	
E-vitamin	1,1 mg TE	L-karnitin	1 mg
K-vitamin	5,1 µg	Kolin	10 mg
		Taurin	5,6 mg
		Nukleotidok	3,3 mg

Összetevők: laktóz (tehéntejből), tejsavófehérje-hidrolizátum (tehéntejből), növényi olajok (pálmaolaj, repceolaj, kókuszolaj, magas olajsavtartalmú napraforgó olaj, napraforgó olaj), galakto-oligoszacharidok (tehéntejből), emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei, szójalecitin), frukto-oligoszacharidok, kálium-hidrogénfoszfát, kalcium-klorid, kalcium-foszfát, halolaj, egysejtűolaj (Mortierella alpina), kolin-klorid, L-askorbinsav, taurin, nátrium-L-askorbát, vas-szulfát, Bifidobacterium breve M-16V, cink-szulfát, inozitol, uridin-5'-monofoszfát nátrium sója, citidin-5'-monofoszfát, DL-alpha tokoferol-acetát, adenozin-5'-monofoszfát, inozin-5'-monofoszfát nátrium sója, L-karnitin, nikotinamid, guanozin-5'-monofoszfát nátrium sója, kalcium D-pantoténát, réz-szulfát, retinil-palmitát, DL-alfa tokoferol, riboflavin, tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid, kálium-jodid, mangán-szulfát, pteroilmonoglutaminsav, fitomenadion, D-biotin, nátrium-szelenit, kolekalciferol, cianokobalamin. **Allergének:** összetevőlistában kiemelve.

Milumil®



PROSYNEO HA

Támogatja az immunrendszert*



**TEJALAPÚ ANYATEJ-KIEGÉSZÍTŐ
TÁPSEZER HIDROLIZÁLT FEHÉRJÉVEL 6-12 hó**

✓ Hidrolizált fehérje
✓ LCP (Omega-3 ALA)

400 g e

*A termék C- és D-vitamin tartalma hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

TUDOMÁNYOSAN
KUTATOTT
ÖSSZETEVŐK

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Milumil® HA 2 Prosyneo

Standard hígítás: Mellékelt adagolókanál lesimítva = 4,94 g Milumil® HA 2 Prosyneo tápszerpor. 3 lesimített adagolókanál (14,82 g) Milumil® HA 2 Prosyneo tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer.

Életkor	Ajánlott tejalapú étkezések száma naponta	Ivóvíz (ml)	Adagoló-kanalak száma	Kész tápszer
6-7 hónap	2-3	180	6	200 ml
8-9 hónap	2-3	210	7	233 ml
10-12 hónap	2	240	8	267 ml
12 hó felett	2	240	8	267 ml

Fontos figyelmeztetés!

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérdezd meg a gyermekorvost, védőnőt a tápszer használatáról!
- Ne térd el az orvos előírásától, illetve a használati utasítástól, mert ez zavart okozhat a kisbabád fejlődésében!

A tápszer elkészítése

1 Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit és mindig tiszta adagolókanalat használj. 2 Forrald fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe. 3 Mérd ki a cumisüvegbe a tápszerport (az adagolási táblázat szerint), zárd le, és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig). 4 Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra. 5 Ellenőrizd a tápszeroldat megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

Gyermeked egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:

- A terméket vegyes táplálékkal kiegészítve használd, ne alkalmazd 6 hónapos kor előtt anyatej-helyettesítő táplálékként.
- A tápszer minden étkezéshez frissen készítsd el, és 2 órán belül használd fel!
- Ne forrald fel a tápszeroldatot és ne használj mikrohullámú sütőt a tápszeroldat elkészítéséhez vagy melegítéséhez a túlforrosodás veszélye miatt.
- A melegítés károsíthatja a tápszerben található Bifidobacterium breve baktériumokat.
- Figyelj arra, hogy babád mindig felnőtt felügyelete mellett igyon, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogápolásról!
- A Milumil® HA 2 Prosyneo tápszer nem alkalmazható: tejfehérje-allergia, laktóz-intolerancia, galaktozémia, glükóz-galaktóz malabszorpció, valamint hal- és szójaallergia esetén.
- A Milumil® HA 2 Prosyneo tápszer a tehéntejfehérjét részben lebontott formában tartalmazza, ezért íze kismértékben eltérhet a szokásos tejalapú tápszerétől.

EGYEDI SZAKÉRTELEM

A csecsemő immunrendszere születéskor még éretlen, idővel fokozatosan fejlődik. Egyes tényezők kihívást jelentenek az immunrendszer kiegyensúlyozott fejlődésére.

400 elkötelezett kutatónk és szakértőnk 40 éve élen jár az anyatej kutatásában. Ez tette lehetővé számunkra, hogy létrehozzuk a tudományosan kifejlesztett Milumil® HA 2 Prosyneo tejalapú anyatej-kiegészítő tápszerünket.

40
— év —
kutatás

az immunrendszer területén

TUDOMÁNYOSAN KUTATOTT ÖSSZETEVŐK

Az egyetlen olyan tápszer család, amely egyszerre tartalmaz Syneo™ formulát és egyedi struktúrájú, kíméletes eljárással kisebb egységekre bontott fehérjéket.

Minden anyatej-kiegészítő tápszer tartalmaz C- és D-vitamint, valamint alfa-linolénsavat.



Szabadalmaztatott galakto- és frukto-oligoszacharid keverék: scGOS/lcFOS (9:1)

Azon baktériumtörzsek családjába tartozik, melyek természetes módon is megtalálhatóak a csecsemők bélfloájában.

Ingyenes tanácsadás

☎ 06 80 33 12 33

✉ milumil@milumil.hu

🌐 www.milumil.hu

Védőgáz csomagolásban.

Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig

Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C)

A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használj!

A tápszer gyermekektől elzárva tartandó.



Forgalmazó: Numil Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.



DANONE

400 g e